Sistema Intrauterino de Levonorgestrel SIU Mirena ®



Orientações: Riscos, benefícios, efeitos colaterais, duração, índice de Pearl
Atenção: Manter método anticoncepcional de curta duração enquanto aguarda consulta ginecológica no CRSM

Indicação

- **Pessoa com útero e idade superior a 19 anos após indicação médica, necessitauso para tratamento das seguintes condições:**

  • Aumento do volume de sangramento não associado anormalidades em exames complementares e que tenha hemoglobina inferior a 10 mg/dl, comprovado por exame prévio - inferior a 6 meses;

  • Adenomiose (com ultrassom confirmatório), também como benefício não contraceptivo;

  • Leiomioma Uterino (LU), sem acidente uterino, exceto subseroso, comprovado pelo USG;

- **Adolescentes: pessoas com até 19 anos 11 meses e 29 dias (critério conforme OMS);**
- **Pessoa vivendo com HIV (PVHIV);**
- **Mulheres em situações de rua e/ou dependentes de substâncias psicoativas e/ousubmetidas a violência doméstica, acompanhadas pela rede de apoio da assistência social (CRAM/ CREAS/ Casa acolhimento/Conselho Tutelar)**
- **Distúrbios psiquiátricos acompanhadas pelos CAPS do município;**
- **Pessoas em tratamento para tuberculose e hanseniase em uso de talidomida.**
- **Multigesta maior (5 gestações);**
- **Pessoas com útero privadas de liberdade**
- **Pós cirurgia bariátrica;**
- **Homens Trans**

Contra indicação:

- Gravidez, doença inflamatória pélvica (DIP),sangramento uterino anormal não revelado, anormalidade do colo ou do útero, incluindo leiomiomas (miomas), se estes causam deformação da cavidade uterina, pólipo e hiperplasia endometrial sem investigação prévia, doença hepática ou tumor hepático, hipersensibilidade (alergia) ao levonorgestrel ou a qualquer componente do produto

Confira:
- Documento norteador Municipal do SIU Levonogestrel
- Protocolo Febrasgo 2023 (Métodos anticoncepcionais reversíveis de longa duração)